Рак пищевода

Добавил(а) Оля
27.12.22 10:25 -

Опухоль преимущественно злокачественная, разрастается из клеток и тканей эпителия на стенке пищевода.

Самым частым симптомом служит нарушение функции глотания. Имеет плохой исход, потому что поздно выявляется.

Классификация заболевания

Виды рака подразделяются по стадии прогрессирования болезни, по метастазам. Симптомы болезни на ранних стадиях заболевания никак не проявляются.

Признаки появляются только после вырастания опухоли до больших размеров, когда она создает препятствие для прохождения пищи. Наиболее часто встречается симптом ощущения комка в горле или нарушение глотания, больной пытается принимать еду в жидкой форме, потому что более жёсткая еда не проходит.

Когда болезнь прогрессирует, то у больного появляется болезненность за грудиной или в глотке, отдает в спину в верхнюю часть. Также может возникать рвота, потому что снижается проходимость пищевода из-за того, что больной не может правильно питаться, у него снижается масса тела, и появляется дисфункция всех органов и систем.

Больного с раком пищевода может беспокоить сухой кашель, потому что раздражается трахея, может появиться осиплость как при хроническом ларингите. На более поздних стадиях в рвотных массах и мокроте, обнаруживаются прожилки крови. При появлении таких симптомов следует обратиться к врачу для установления правильного диагноза.

Диагностика рака пищевода

Для установления диагноза больному проводится обследование биопсия, также могут применяться рентгенография легких и контрастная рентгенография, для установления места расположения опухоли и для определения степени проходимости.

Для того чтобы узнать, где располагаются метастазы, проводится УЗИ брюшной полости. Исследование помогает узнать точное расположение, и размеры опухоли, кроме того больному проводится исследование биопсию.

Лечение выбирается в зависимости от места расположения опухоли, размера новообразования, степени стеноза гортани и пищевода, присутствия метастазов в других органах и общего состояния больного.

Если у больного операбельная опухоль, то проводится иссечение, лучевая терапия хорошего эффекта не приносит. Если иссечение опухоли невозможно, то необходимо проводить парентеральное питание.

Прогноз и профилактика

После проведенной операции выживаемость среди больных низкая, поэтому больные не живут 5 лет. Если операция не была проведена, то больной проживет не больше 4 месяцев с момента обнаружения новообразования.

При распространении метастазов в другие органы прогноз также не благоприятный. Для профилактики болезни больному проводится обширная иммунизация против гепатитов. Также необходимо обезопасить себя от вредных химических и токсических веществ, отказаться от алкоголя. Кроме того, необходимо соблюдать строгую диету и щадящий режим, проходить ежегодное обследование, необходимо внимательно следить за своим весом и при резком уменьшении веса, необходимо обратиться к врачу.

=======

Добавил(а) Оля
27.12.22 10:25 -

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.