Добавил(а) Оля
24.01.23 12:20 -

Липосаркома – злокачественное образование, возникающее путем преобразования клеток соединительной ткани в жировые.

Опухоль способна поражать любую область человеческого организма.

Преимущественные места локации: забрюшинное пространство, ближайшие к центру тела (проксимальные) отделы нижних конечностей, плечевая область.

Причины развития заболевания

Полного обоснования развития липосаркомы на данный момент не существует.

Но к наиболее распространенным причинам можно отнести:

• наличие в организме липомы (доброкачественная жировая опухоль);

• нейрофиброма (доброкачественная опухоль из клеток нервной ткани);

• механические травмы;

• радиационное воздействие на организм;

• взаимодействие с токсичными веществами;

• прием гормональных препаратов.

Симптомы липосаркомы

На основании наблюдений установлено, что большинство случаев развития опухоли проходит без каких-либо явных симптомов.

Пациенты обращаются за медицинской помощью, когда опухоль начинает определяться визуально либо отмечаются следующие симптомы:

1. Опухоль нижних конечностей: • воспаление стенок вен, тромбоз вен; • отек нижней конечности; • ишемия конечности; • повышение температуры тела; • малокровие.

2. Опухоль забрюшинного пространства: • ощущение сдавливания органов брюшной полости; • вздутие живота; • трудности с мочеиспусканием; • кишечная непроходимость; • болевые ощущения и тяжесть в области поясницы; • тошнота или рвота.

3. Опухоль плеча: • в месте локализации опухоли заметны изменения кожных покровов (цвет, температура); • нарушение двигательных функций; • болевой синдром. Для общего состояния организма больного характерны: • потеря аппетита; • истощение; • слабость; • быстрая утомляемость; • депрессия.

При самом критическом развитии болезни – разложении опухоли – наблюдается резкое ухудшение состояния пациента.

Диагностика

Диагноз «липосаркома» ставится на основании опроса пациента, внешнего осмотра, результатов МРТ (определение границ опухоли и состояния близлежащих органов и тканей), УЗИ (определение состояния сосудов и мягких тканей вблизи опухоли) и рентгена (определение размера и положения опухоли). Обязательно берется биопсия пораженного органа с последующим гистологическим исследованием.

Методы лечения липосаркомы

Хирургический метод (является обязательным). Злокачественную опухоль иссекают и удаляют вместе с прилегающими к ней мышцами и тканями. В случае вовлечения в процесс патологии костей предпринимают ампутацию конечности.

Лучевое облучение. Применяется до операции и после нее. Перед хирургическим вмешательством облучение направлено на уменьшение опухоли в размерах, после операции – для предотвращения распространения рака и для исключения рецидива.

Химическая терапия. Назначается после операции при распространении метастазов. Прогноз 50 % – выживаемость пациентов до 5 лет. от 25 % – выживаемость пациентов до 10 лет. 35 % – вероятность возникновения рецидива заболевания. 30 % – вероятность развития метастазов.

Большое значение имеет раннее диагностирование опухоли и возраст пациента. В детском возрасте прогноз более благоприятен (80 % – выживаемость до 5 лет).

Образование липосаркомы чаще наблюдается у пожилых людей. В группе особого риска мужчины от 45 лет. В целях профилактики развития липосаркомы рекомендуется прием лекарственных препаратов только по назначению врача, периодический медосмотр, исключение травмоопасных видов спорта и радиационного излучения.

=======

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.