

Схема приёма фракции АСД-2 при раке.

Добавил(а) Оля - Последнее обновление 15.04.24 13:41

Существуют несколько схем приёма фракции [АСД-2](#) . При онкологии необходима интенсивная схема приёма АСД-2. Автор препарата академик Дорогов, рекомендует применять АСД - 2 [при онкологии](#) четыре раза в сутки.

Прием ведется в 8:00, 12:00, 16:00, и 20:00.

с 1-го по 5-й день – принимать по 5 капель фракции АСД 2

с 6 –го по 10-й – по 10 капель

с 11-го по 15-й – по 15 капель

с 16-го по 20-й – по 20 капель

с 21-го по 25-й – по 25 капель

с 26-го по 30-й – по 30 капель

с 31-го по 35-й – по 35 капель

с 36-го по 40-й – по 40 капель

с 41-го по 45-й – по 45 капель

с 46 –го и до полного выздоровления – по 50 капель препарата за один прием.

Вода для употребления во всех случаях берется кипяченая и охлажденная. АСД обладает резким неприятным запахом, и при невозможности принимать его с водой (например, детям) следует употреблять виноградный сок.

Категорически запрещается разводить фракцию АСД-2 минеральной или газированной водой. Для компрессов поверх марли накладывается пергаментная бумага с целью предотвращения испарения препарата. Затем накладывается толстый слой ваты и забинтовывается. Накладывание мажевых повязок может вызвать перегревание кожи и общую реакцию в виде повышения температуры.

При лечении кожных заболеваний противопоказан контакт с раздражающими средствами - бензином, керосином, скипидаром, - а также нежелательно смачивать кожу водой.

Можно практиковать следующий порядок ком-прессов на 1 час: чулок х/б, смоченный 20%-ным раствором АСД, пищевая пленка, разовая пеленка. Все, кроме чулка - разового использования. Ноги, руки и чулки промываются с моющим средством (ЛОК). АСД-2 принимать внутрь, разбавляя в 1/2 стакана холодной кипяченой воды, 2 раза в день - утром и ве-чером за 30 минут до еды.

Во время приема препарата нужно есть много белковой пищи.

Во время приема препарата и спустя 2-3 часа после приема АСД не употреблять других лекарств, алкогольные напитки и табак исключаются!

В случае обострения процесса прием прекратить до утихания болей, после чего прием возобновить. 4.1 см³ АСД, если капать с канюли шприца - 35 ка-пель. После 6 дней приема - перерыв на день. После месяца приема - перерыв на неделю. После 3 месяцев

Схема приёма фракции АСД-2 при раке.

Добавил(а) Оля - Последнее обновление 15.04.24 13:41

приема - перерыв 15 дней. Первичный курс приема - 6 месяцев или до полного выздоровления.

Далее курс можно повторить, в зависимости от степени заболевания (рак лечится до полутора лет).

?? Вы можете написать сообщение автору статьи - Болиголов лечение рака, в [Контакты](#) или

отправить письмо автору на почтовый ящик: olia-78@mail.ru

Меня зовут Ольга. Я фито терапевт. Раньше я жила и училась в Алтайском крае, г.Барнаул. Занимаюсь проблемой онкологии более 9 лет. Накопила огромный багаж знаний в этой области и могу помочь Вам разобраться в тонкостях лечения рака болиголовом и другими растительными настойками.

У Вас возникли вопросы? Вы всегда можете написать мне лично, на мой эл.ящик. Ни одно письмо не остаётся без ответа. Отвечать стараюсь сразу, в течение 24 часов.

(Если Вы написали письмо на почтовый ящик olia-78@mail.ru и в течение суток не дождались ответа, ПЕРЕЗВОНИТЕ мне! Возможно Ваше письмо случайно попало в папку СПАМ или потерялось. Такое бывает.)

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

<https://vk.com/konoplickayafitoterapevt>

<https://vk.com/mipobedimvmeste>

<https://vk.com/travialfit>

<https://ok.ru/group/70000004855047>

Ещё статьи по теме лечения рака:

[Победим рак вместе - Болиголов](#)

[Рецепт приготовления настойки Болигорова](#)

[Система лечения рака болиголовом по методу Тищенко В.В](#)

[Как правильно проводить лечение рака ядами Болигорова и Аконита
Джунгарского](#)